勝利動物醫院 Victory Animal Hospital

勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：info@globavet.com

貓卡里西病毒感染症

什麼是貓卡里西病毒？

貓卡里西病毒感染症（FCV）是一種使貓隻引起上呼吸道感染及口腔疾病的病毒。世界各地都有貓隻受這種病毒感染。

雖然有多種不同的病毒及細菌可讓貓隻患上呼吸道疾病，但是卡里西病毒是其中一種較常使貓隻患病的傳播媒介。

患卡里西病毒感染症會出現什麼症狀？

典型的上呼吸道症狀涉及鼻腔及喉嚨，可引起的症狀包括：打噴嚏、鼻腔阻塞、結膜炎（眼簾內膜發炎），以及鼻腔或眼睛流出液體。液體可以是透明或化膿的（含有膿液）。

患卡里西病毒感染症的貓隻除了有這些典型症狀外，其舌頭、硬顎、牙齦、咀唇或鼻腔通常會形成潰瘍；若貓隻有口腔潰瘍，牠通常會大量地流口水。其他不屬於上呼吸道感染的症狀包括：厭食症、昏睡、發燒、淋巴腺肥大及眼瞼痙攣（瞇著眼睛）。

貓隻如何患上卡里西病毒感染症？

卡里西病毒極具傳染性，而受感染貓隻的唾液或鼻腔眼睛的分泌物可帶有病毒粒子。假如受感染貓隻打噴嚏，病毒粒子可經由空氣傳播至幾米的距離。

假如直接接觸到受其他感染的貓隻，或從環境中接觸到帶有病毒的分泌物，體質較弱的貓便可能因此受感染。

儘管所有體質較弱的貓都有機會患上卡里西病毒感染症，然而出現於幼貓的症狀相對較為嚴重。

如何治療卡里西病毒感染症？

若症狀簡單的話，大多數患卡里西病毒感染症的貓隻都可以按其症狀在家治療。若然貓隻的眼睛流出膿液，獸醫可能會給予外塗眼藥。雖然抗菌藥物對病毒感染

無效，但是特別對幼貓而言，它可預防因併發症引起的次發性細菌感染。此外，獸醫也會給予抗炎藥物，以舒緩貓隻瘸腿的症狀。 調節或支援免疫系統的療法會對長期患有潰瘍的貓隻有益處。

假如貓隻脫水、抑鬱或病情嚴重，獸醫會建議你的寵物入院，以進行深切治療，包括靜脈輸注及其他支援性的治療。

如何預防卡里西病毒感染症？

"為貓隻注射包含能對抗卡里西病毒的標準「核心」疫苗..."

假如你的貓不幸接觸到卡里西病毒，為它注射包含能對抗卡里西病毒的標準「核心」疫苗，會有助減輕患病程度，以及縮短患病的時間。滿 6 週至 16 週的幼貓需要接受這種疫苗的加強劑，並於一年後最少接受一次加強劑。貓隻在幼年接受較頻繁的接種後，最少每隔 1 至 3 年需要接受一次加強劑。在貓隻處身高危環境之前，例如在出國、接受寵物美容服務、參考貓展或接觸其他可能帶有卡里西病毒的貓隻以先，為自己的愛貓注射疫苗加強劑是尤其重要的。獸醫會按個別貓隻建議合適的疫苗注射時間表。

家中飼養的其他貓隻有受感染的風險嗎？

若貓隻患有急性的卡里西病毒感染，牠在潛伏期可感染其他貓隻，而其他貓受感染後，最少經過 3 週的時間才會顯出症狀。一隻帶有卡里西病毒的貓很可能會傳染其他貓隻。未注射疫苗、年幼或有潛在慢性問題的貓隻比較容易受感，而且病情可能會較為嚴重。

這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：Cheryl Yuill 獸醫學博士、理科碩士、CVH

© 版權聲明 2010 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。