



勝利動物醫院
Victory Animal Hospital

勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：info@globavet.com

貓隻感染鉤蟲


鉤蟲是什麼？

鉤蟲是一種寄生蟲，寄居於貓隻及狗隻的腸道。它們的名稱來源是因為有好像鉤的口器，它們用鉤形的口器將自己鉤在寄主的腸壁上。

為什麼有些貓隻較容易受鉤蟲感染？

鉤蟲較常見於溫暖潮濕的環境。當環境過分擠迫或衛生情況欠佳，都會引起感染。

貓隻如何感染鉤蟲？



雌性鉤蟲會在貓隻的糞便中產下數以百計的微型卵。肉眼是不能看到這些卵的。幼蟲或未成年的鉤蟲會從卵中孵化，然後逗留在泥土中幾星期至幾個月不等。當貓隻梳理腳掌時不慎吞下幼蟲，便會發生受鉤蟲感染的情況。

貓隻受鉤蟲感染後，會出現什麼臨床徵象？

貓鉤蟲有傾向“抓”住小腸壁覓食，而且被認為會“進食組織”。當它們吸血時，會在吸血的地方注射一種抗凝血物質。因此，貓鉤蟲在體內覓食的時候，貓隻的血液會流失，被鉤蟲依附的部位會持續流血，而血液會流入腸道。相比成年貓隻，幼貓因為被鉤蟲吸血引起的貧血，會造成更大的問題。

受鉤蟲感染的證據包括：貧血、大便中發現消化過的血液、毛髮觀感欠佳及體重下降。

如何診斷貓隻受鉤蟲感染？

診斷鉤蟲感染的方法稱為糞便漂浮集卵法。將少量貓糞便混合在一種特別的溶液中，這會讓鉤蟲卵浮在其上，並且會依附在溶液頂端的玻璃片上。

由於鉤蟲卵的外型獨特，因此在顯微鏡下可以很容易分辨它們。

如何治療貓鉤蟲感染？

幸運的是，治療方法既簡單安全，而價格相對上並不高昂。在餵飼貓隻服用稱為“驅蟲藥”的杜蟲藥後，便可以殺滅鉤蟲成蟲。

不過大部分驅蟲藥不能殺滅未成年的鉤蟲。因此受感染的貓隻需要接受最少兩次療程，每次療程相隔兩至三星期，為要待上一次治療剩下的鉤蟲幼蟲成熟後再加以殺滅。要為幼貓杜蟲，最理想的做法是在牠們接受疫苗時一併進行。

可以預防鉤蟲嗎？


要預防鉤蟲感染，應該採取下列措施：

“所有新生貓兒應該在兩至三週歲的時候，
使用獸醫認可的驅蟲劑。”

- 所有新生幼貓應該在兩至三週歲的時候，使用獸醫認可的驅蟲劑。為了有效地破壞大部分常見的腸道寄生蟲的生命週期，獸醫會向你建議適合幼貓的杜蟲時間表。
- 當檢查到貓隻有任何寄生蟲時，應即時給予杜蟲治療；對於可重覆受感染的高危貓隻而言，定期杜蟲可能是合適的方法。
- 高度建議每月進行一次鉤蟲預防措施，以預防貓隻受鉤蟲感染。

“適當地棄置貓糞便...”

- 適當地棄置貓糞便是十分重要的，特別要清除留在草地及遊樂場的貓糞便。
- 對於兒童來說，嚴格控制衛生是極其重要的。不要讓兒童於潛在受污染的環境內玩耍。也要注意兒童在公園及露天沙地嬉戲的風險。較為安全的沙地的四周會設有遮蓋物，而且也有助預防兒童受腸道寄生蟲的感染。
- 防控老鼠也是很重要的，因為老鼠有份將鉤蟲傳播給貓隻。



“...應該每天清除垃圾箱內的貓糞便。”

- 盡可能的話，應該每天清除垃圾箱內的貓糞便。在處理貓糞便後，請務必清潔雙手。

鉤蟲可以傳播給人類嗎？

貓鉤蟲不會感染人類的腸道，然而它們可以鑽入人類的皮膚，引起一種稱為“皮膚幼蟲移行症”的疾病。這種皮膚感染也稱為“地癢疹”，但是鉤蟲的幼蟲不會在人體變為成蟲。人類的皮膚會受到感染，必須因著皮膚接觸到濕潤而受鉤蟲幼蟲感染的泥土。因此當維持個人良好衛生時，這種感染很少發生。

這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：*Ernest Ward* 獸醫學博士

© 版權聲明 2009 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。