



勝利動物醫院
Victory Animal Hospital

勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：info@globavet.com

狗隻患甲減

甲狀腺是什麼？它有什麼功能？


甲狀腺是身體其中一個最重要的腺體。它位於頸部，在氣管或“嚟門”旁邊。它有兩個腺體，分別位於氣管的兩側。甲狀腺是由腦下垂體控制的，而腦下垂體位於大腦的底部。

“假如甲狀腺過度活躍（甲亢），身體的代謝會上升。假如甲狀腺功能不足（甲減），代謝便會減慢。”

甲減的成因是什麼？

狗隻患甲減的成因通常由這兩種疾病引起的：淋巴細胞甲狀腺炎或特發性甲狀腺衰退。

超過 95%患甲減的狗隻是由這兩個成因引起的。餘下的 5%是由於患有罕見疾病，例如甲狀腺癌。



Used Under License
Copyright© Lifelearn Inc.

甲減有什麼臨床徵象？

當代謝率減慢下來，實際上體內每個器官都會受到影響。大多數患有甲減的狗隻會出現以下一個或多個症狀：

- 雖然食慾沒有增加，但是體重卻增加。
- 昏睡及失去對運動的渴望。
- 不能忍受寒冷（很容易感到寒冷）。
- 毛髮乾燥暗啞，加上脫毛及脫皮過量。
- 毛髮變得非常稀薄甚至光禿。
- 皮膚顏色變深。
- 皮膚及耳朵更容易及更經常受感染。
- 在剪毛或剃毛後，毛髮不再長出來。
- 膽固醇偏高。
- 心跳率減慢。

有些狗隻也會出現其他異常情況，例如：

- 面部皮膚變厚，使牠們的表情“看起來好像很悲傷”。
- 因神經功能異常引起非疼痛的癱腿、腳掌拖行、缺乏協調力及頭部傾側。
- 雄性狗隻會失去性慾及不育。
- 雌性狗隻會沒有發情期、不孕及流產。
- 雙眼的角膜會積聚脂肪。
- 由於淚水分泌減少，會引起乾性角結膜炎（KCS）或“乾眼症”。

如何診斷甲減？

最常用的篩選測試是測量四碘甲狀腺素（TT4）的總量，可量度血液中的主要甲狀腺荷爾蒙。藉由進行游離四碘甲狀腺素（T4）的平衡透析法及/或可評估不同形態的甲狀腺素之“甲狀腺評委”，便可確診狗隻患甲減。



甲減有方法治療嗎？

“甲減是可以治療，但是不能治癒的。”

甲減是可以治療，但是不能治癒的。治療方法是口服甲狀腺激素替代。在狗隻餘生之中，必須給予這種藥物。

如何判斷適合的劑量？

根據狗隻的體重，可以按比例給予狗隻適當劑量的甲狀腺激素替代。在口服藥物一個月後，需要抽取血液樣本，以檢驗甲狀腺荷爾蒙水平是否回復正常。

由於狗隻對甲狀腺激素替代的耐受性可以隨著時間改變，因此需要定期調節劑量。患病狗隻通常需要每六個月重新測試四碘甲狀腺素（TT4）的總量一次。為了確保狗隻服藥的劑量不多不少，請確保與獸醫緊密溝通。

這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：Ernest Ward 獸醫學博士

© 版權聲明 2009 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。