勝利動物醫院
Victory Animal Hospital

勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：info@globavet.com

貓隻體內的寄生蟲

貓隻的體內可以有哪些寄生蟲或蠕蟲？

有幾種不同類型的體內寄生蟲可使貓隻患病，當中包括線蟲或蛔蟲，主要例子有貓蛔蟲（*Toxocara cati*）、弓蛔蟲（腸道蛔蟲，*Toxascaris leonina*）及心絲蟲（*Dirofilaria immitis*）。條蟲的主要例子有孔條蟲（*Dipylidium caninum*）、條蟲屬（*Taenia*）及胞蟲屬（*Echinococcus*）。鉤蟲屬（*Ancylostoma*）在世界多處地區都是貓隻常見的體內寄生蟲。

貓隻受寄生蟲感染會很嚴重嗎？

體內寄生蟲對幼貓可以造成很嚴重的問題。鉤蟲能夠引起貧血，而蛔蟲可以使幼貓生長及發育不良。

體內寄生蟲只會偶爾使成年貓隻致命，而且通常只發生在身體虛弱或免疫力受抑制的貓隻身上。

心絲蟲感染對狗隻而言是主要的致命疾病，而且對貓隻的威脅有增加的趨勢。心絲蟲感染是經由蚊子傳播的。



假如貓隻體內有蠕蟲，會出現什麼問題？

蛔蟲

假如處於成長期的幼貓受大量蛔蟲感染，蛔蟲可以使幼貓發育遲緩，引起嚴重的消化問題，導致牠的消化道有過量氣體。這些幼貓看起會有明顯的“大肚子”。線蟲（蛔蟲）可以在寄主的腸道裡自由移動。蛔蟲可以在貓與貓之間傳播，而無須透過中間寄主，而且經由留在糞便的卵由一隻貓傳播至另一隻貓。

鉤蟲

鉤蟲（尤其是巴西鉤蟲）是貓隻最可致病的腸道寄生蟲之一。鉤蟲的長約半吋至一吋（1 至 2 厘米），會依附在寄主的小腸壁並在該處吸食血液。由於鉤蟲會吸食血液，因此可以使貓隻嚴重貧血。具傳染性的幼蟲可經由口部或皮膚進入寄主的身體，通常是經由貓隻的腳掌。因為鉤蟲鑽入寄主的皮膚時會引起發炎，因此可以引致濕疹及次發性細菌感染。

條蟲

條蟲要成功地傳播，需要跳蚤、雀鳥或某些品種的老鼠作為中間寄主。換言之，你的愛貓不能從另一隻貓或狗身上直接感染條蟲。

孔條蟲（*Dipylidium caninum*）是最常見於貓隻的條蟲，它對成年貓隻造成的問題不大，但是幼貓若感染它，可以造成消化不良及發育遲緩。孔條蟲的中間寄主是跳蚤。

條蟲屬（*Taenia*）通常會感染成年貓隻，引起的問題並不多。幼貓大多數在生食獵物時會偶爾受條蟲屬感染，情況是否嚴重要視乎涉及哪個品種，假如感染的條蟲數量很多，可以阻塞腸道。條蟲屬的中間寄主是老鼠或兔等小型哺乳類動物，以及一些雀鳥品種。

胞蟲屬（*Echinococcus*）是另一種條蟲，由於它可引起人畜共通傳染病，意思是人類也可以受感染，因此備受高度重視。這類條蟲成蟲體型很小，長度只有大約四分一吋（5 至 6 毫米）。綿羊可以作為其中間寄主，還是幼蟲的胞蟲屬會在各個器官形成包蟲囊腫。有時候人類也可以是它的中間寄主。在人類身上，這些包蟲囊腫可以出現在肺部或大腦中。

心絲蟲

貓隻受心絲蟲感染的個案不多，但是發病率在北美某些地區在上升趨勢。在貓隻身上，因心絲蟲感染而出現的症狀是非特定的。心絲蟲可以引起突然咳嗽及呼吸急促、體重下降及嘔吐，也有一些症狀與貓隻其他常見病相同。偶爾會有受心絲蟲感染的貓隻被發現死亡，然後在屍體檢驗時才能確診。心絲蟲是大型的蠕蟲，可長達 6 至 14 吋（15 至 36 厘米）。它們主要寄居在貓隻的右心室及附近的血管內。

這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：Ernest Ward 獸醫學博士
© 版權聲明 2009 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。