



勝利動物醫院
Victory Animal Hospital

勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：info@globavet.com

狗隻體內的寄生蟲

狗隻體內可以有哪些寄生蟲或蠕蟲？

有幾種不同類型的體內寄生蟲可使狗隻患病，當中包括線蟲或蛔蟲，主要例子有狗蛔蟲 (*Toxocara canis*) 及心絲蟲 (*Dirofilaria immitis*)。條蟲的主要例子有孔條蟲 (*Dipylidium caninum*)、條蟲屬 (*Taenia*) 及胞蟲屬 (*Echinococcus*)。

狗隻受寄生蟲感染會很嚴重嗎？

體內寄生蟲對幼犬可以造成很嚴重的問題。鉤蟲能引起貧血，而蛔蟲可以使幼犬生長及發育不良。

成年狗隻因體內寄生蟲而致命只會偶爾發生，而且通常僅發生在身體虛弱或免疫力受抑制的狗隻身上。

心絲蟲感染一種是主要的致命疾病。對小動物來說，此病被認為是最嚴重的疾病之一。心絲蟲感染是經由蚊子傳播的。


假如狗隻體內有蠕蟲，會出現什麼問題？

蛔蟲

假如處於成長期的幼犬受大量蛔蟲感染，蛔蟲可以使幼犬發育遲緩，引起嚴重的消化問題，導致牠的消化道有過量氣體。這些幼犬看起來會有明顯的“大肚子”。線蟲（蛔蟲）可以在寄主的腸道裡自由移動。蛔蟲可以在狗與狗之間傳播，而無須透過中間寄主，至於留在糞便的卵可以由一隻狗傳播至另一隻狗。

鉤蟲

對狗隻而言，鉤蟲（尤其是巴西鉤蟲）是致病率最高的腸道寄生蟲之一。鉤蟲長約半吋至一吋（1 至 2 厘米），會依附在寄主的小腸壁並在該處吸食血液。由於鉤蟲會吸食血液，因此可以使狗隻嚴重貧血。具傳染性的幼蟲可經由口部或皮膚進入寄主的身體，通常會通過狗隻的腳掌。由於鉤蟲鑽入寄主的皮膚時會引起發炎，因此可以引致濕疹及次發性細菌感染。



鞭蟲

鞭蟲是體型細小的蠕蟲，長度通常只有四分之一吋（6 毫米）。它們居住在寄主的大腸，可以刺激其大腸及引起炎症。受鞭蟲感染的症狀包括：帶有水樣便的慢性腹瀉、腹瀉帶血及體重下降。

條蟲

條蟲要成功地傳播，需要跳蚤或某些品種的老鼠作為中間寄主。換言之，你的愛犬不能從另一隻狗或貓身上直接感染條蟲。

孔條蟲 (*Dipylidium caninum*) 是狗隻最容易感染的條蟲，它對成年狗隻造成的影響不大，但是幼犬若感染它，可以引致消化不良及發育遲緩。孔條蟲的中間寄主是跳蚤。

條蟲屬 (*Taenia*) 通常會感染成年狗隻，引起的問題不算嚴重。幼犬會偶爾受條蟲屬感染，情況是否嚴重視乎涉及哪個品種，假如感染的條蟲數量很多，可以阻塞腸道。條蟲屬的中間寄主是老鼠或兔等小型哺乳類動物，以及一些雀鳥品種。

胞蟲屬 (*Echinococcus*) 是另一種條蟲，由於它可引起人畜共通傳染病，意思是人類也可以受感染，因此備受高度重視。這類條蟲成蟲的體型很小，長度只有大約四分之一吋（5 至 6 毫米）。綿羊可以作為其中間寄主，還是胞蟲屬幼蟲會在各個器官形成包蟲囊腫。有時候人類也可以是它的中間寄主。在人類身上，這些包蟲囊腫可以出現在肺部或大腦中。

心絲蟲

心絲蟲感染的典型臨床症狀有疲倦、咳嗽及身體狀態欠佳。受心絲蟲感染的狗隻偶爾會被發現已死去，然後在屍體檢驗時才能確診。心絲蟲是大型的蠕蟲，可長達 6 至 14 吋（15 至 36 厘米）。它們主要寄居在狗隻的右心室及附近的血管內。

這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：*Ernest Ward* 獸醫學博士

© 版權聲明 2009 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。