



勝利動物醫院
Victory Animal Hospital

勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：info@globavet.com

狗隻患犬舍咳或氣管支氣管炎

犬舍咳是什麼病？

犬舍咳 (*Kennel Cough*) 是廣義的狗疾病，泛指任何具感染性或傳染性的狗疾病，而咳嗽是其中一種主要的臨床徵象。具感染性的氣管支氣管炎 (*infectious tracheobronchitis*) 與這病有關。氣管支氣管炎一詞形容發生在氣管或“嗓門”的支氣管感染。

“有幾種病毒和細菌可以引起犬舍咳，而且通常是同時引起的。”

有幾種病毒和細菌可以引起犬舍咳，而且通常是同時引起的。它們包括有犬第二型腺病毒 (有別於可引起具傳染性肝炎的犬第一型腺病毒)、犬副流行性感冒病毒及支氣管敗血性包台拉菌 (*Bordetella bronchiseptica*)。由於感染是因狗隻共住一室時擴散的，而且通常發生在居於狗屋的狗隻，因此這病名為“犬舍咳”。

除了咳嗽以外，犬舍咳還有什麼臨床徵象？

其臨床徵象是多變的。它有時只是輕微的疾病，但是有些個案的咳嗽屬於慢性，而且可持續幾星期之久。一般的臨床徵象包括：通常被形容為像“鵝鳴”的大聲咳嗽、流眼水及流鼻水、扁桃腺腫脹、喘鳴、食慾不振及有抑鬱的行為。大多數患氣管支氣管炎的狗隻會在按摩喉嚨或喉嚨觸摸檢查時咳嗽。很多時候狗隻在感染犬舍咳後，引起的乾咳會持續幾星期。



狗隻如何患上犬舍咳？

犬舍咳的傳染性極強，當狗隻散步、玩耍或分享盛水容器時，狗隻之間的隨意接觸可以很容易地傳播犬舍咳，例如互相聞一聞對方。

如何治療傳染性氣管支氣管炎？

病毒感染並無特定的療法，但是很多較為嚴重的徵象是因涉及細菌引起的，尤其是支氣管敗血性包台拉菌 (*Bordetella bronchiseptica*)。使用抗生素能有效對抗這種細菌。

有些病例需要接受較長的治療，但是大多數的感染可以在一至三星期內康復。即使已經殺滅細菌，輕微的臨床徵象依然可以持續幾週。在一些個案中，止咳藥和消炎藥可以提供舒緩作用。

如何預防我的愛犬感染犬舍咳？

獸醫多數會建議狗隻接受腺病毒及犬副流行性感冒病毒等疫苗。對於會出國、接受寵物美容服務及會與其他狗隻互動（如上狗公園）的狗隻，則強烈建議牠們接受犬舍咳疫苗。

狗隻如何接受犬舍咳疫苗？

接受犬舍咳疫苗有兩種方法，分別是注射及經鼻內。經鼻內是指給用液體疫苗的鼻滴劑，這可以使傳染媒介首先攻擊的部位，包括鼻腔、喉嚨和氣管黏膜，在這些部位發展出免疫力；而且相比注射性的疫苗，它可更迅速地抵禦感染。

這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：*Ernest Ward* 獸醫學博士

© 版權聲明 2009 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。