



勝利動物醫院  
Victory Animal Hospital

## 勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：[info@globavet.com](mailto:info@globavet.com)


## 痙攣發作——狗隻患癲癇

### 什麼是癲癇？

這是一種腦部障礙，特徵是復發性的痙攣發作，但是沒有任何已知的成因或異常的腦部受損。換句話說，腦部看起來好像正常，但是不能正常運作。

### 癲癇的成因是什麼？

癲癇的成因至今尚未明白。它可能與生物化學或神經化學物質異常有關。儘管其傳播途徑未明，但是科學家相信這病在多個狗隻品種具遺傳性。癲癇病發率較高的品種包括：小獵犬、牧羊犬、邊境牧羊犬、拳師犬、可卡犬、可麗牧羊犬、臘腸狗、金毛尋回犬、愛爾蘭長毛獵犬、荷蘭毛獅犬、拉布拉多犬、法國貴婦犬、聖伯納德犬、喜樂蒂牧羊犬、西伯利亞雪橇犬、史賓格犬、威爾斯柯基犬及剛毛獵狐梗。癲癇較常見於狗隻，但是較罕見於貓隻。



Used Under License  
Copyright© Lifelearn Inc.

### 癲癇有哪些臨床徵象？

痙攣發作是你曾親眼目睹後便不會忘記的情境之一。它通常從頸部僵硬開始，然後雙腳會失足並跌倒，不受控地做出咀嚼的動作、四肢劃動、小便失禁，以及身體劇烈地振動和顫抖。在發作之後，寵物看起來可能會神智不清、一臉茫然或昏昏欲睡。痙攣發作可持續幾秒至幾分鐘不等。據估計，所有狗隻之中有多達 2% 在一生中會經歷痙攣發作。

痙攣發作分為三個明顯的階段：

- 1. 預兆：**這是寵物痙攣發作前的時期，特徵是看起來過度焦慮。這階段一般歷時少於一分鐘。寵物似乎對自己將會痙攣發作有「預知感覺」。
- 2. 痙攣發作：**每次痙攣發作都可能分別，而且可以由輕微的肌肉抽搐至嚴重的大小便失禁不等。有時候也會失去意識。
- 3. 發作後期：**痙攣發作之後的階段，特徵是神志不清、虛弱和呼吸急促。其嚴重性要視乎痙攣發作的嚴重程度。若是嚴重的發作，有可能會暫時失明和筋疲力盡。

## 如何確診患癲癇？

確診癲癇是“按照排除法”，即是當痙攣的所有其他成因經已排除後，便可確診狗隻患癲癇。先要仔細地瞭解寵物的病歷，並進行身體檢查，然後進行診斷性的測試，包括血液和尿液測試及放射攝影。要視乎初步測試的結果，獸醫可能會建議進行額外測試，例如膽汁酸測試、腦脊液（CSF）分析、電腦斷層掃描（CT）或磁力共振成像（MRI）。

## 如何治療癲癇？

一旦寵物確診患癲癇後，獸醫會建議給予牠服用不同的抗癲癇藥。抗癲癇藥是非常強效的藥物，而且寵物在餘生必須繼續接受藥物治療。

假如寵物停止或從新開始服用抗癲癇藥，那麼牠將來會痙攣發作的風險和嚴重性可能會提高。因此，寵物必須符合下列條件之一，獸醫才會提供抗癲癇藥物治療：

- 一個月內發作超過一次：你需要將寵物每次痙攣發作的詳情記錄下來，以判斷痙攣發作的頻率。
- 叢集性發作：假如寵物的痙攣發作屬於叢集性，即兩次發作只相隔非常短的時間，病情可能會惡化成可危及性命的癲癇持續狀態，其特徵是可持續數小時、不間斷及反復的發作。癲癇持續狀態是需要緊急治療
- 強直陣攣或嚴重的發作：屬於持久或極度劇烈的痙攣發作，可能會隨著時間惡化下去，因此應加以預防。



Used Under License  
Copyright© Lifelearn Inc.

## 患癲癇的寵物的預後情況會怎樣？

大多數狗隻對抗癲癇藥耐受良好，而且能重拾正常的生活方式。但是有些患病狗隻會繼續經歷間歇性的突破性痙攣發作。許多狗隻需要定期調節牠們的藥物劑量，有少數狗隻更需要隨著時間服用更多其他藥物。

這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：Ernest Ward 獸醫學博士

© 版權聲明 2009 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。