



勝利動物醫院  
Victory Animal Hospital

## 勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：[info@globavet.com](mailto:info@globavet.com)

## 牙根膿腫

### 什麼是牙根膿腫？

牙根膿腫是一種嚴重的感染，通常是因牙齒破裂或牙齒受創傷後，在牙齒根部形成的。

### 牙根膿腫的成因是什麼？

當細菌進入暴露出來的牙根管，便會形成牙根膿腫。在動物身上，當牙齒破裂而露出珐瑯質下面的組織時，這情況會發生。牙根膿腫也可能與牙周病相關，而牙周病是指牙齒周圍的組織受感染。

“最常見的成因是牙齒破裂或牙齒受創傷。”

### 牙根膿腫最常發生在什麼位置？

每一棵牙齒都有斷裂的風險，但是最常出現牙齒斷裂和形成牙根膿腫的，是發生在上顎和下顎的犬齒，然後是上顎的第四小白齒。它們又稱為裂肉齒或肉食齒，故此形容這一類的膿腫為裂肉齒膿腫是很合適的。

當有一隻或兩隻裂肉齒斷裂，然後暴露了裡面的牙囊，該處可以形成嚴重的感染和極大的痛楚。

### 什麼是牙齒片塊斷裂？

當寵物的牙齒用某一個角度和某一種力度咬硬物，以致一小片牙齒掉出或一大片牙齒剝落，便會形成牙齒片塊斷裂，而且通常會將裡面敏感的牙本質以及神經線暴露出來。掉落的牙齒片塊可以是一小片或是一大片不等。



## 若我的寵愛有膿腫牙齒，會有任何明顯的症狀嗎？

儘管我們知道膿腫牙齒可以引起極大痛楚，然而當寵物有牙齒膿腫時，通常不會顯示任何明顯的徵象。但是寵物或許會不願意啃咬自己的玩具，又是當你摸牠的頭的時候，牠可能會縮開。若你是細心的主人，可能會留意到自己的寵物只用口腔的某一邊進食或咀嚼，又或者當牠用有膿腫牙齒的一邊啃咬時，食物會從口中掉下來。有些患病寵物會有難聞口氣，也有一些會抓自己受影響的某邊臉，或借用地面搓揉某邊臉。

假如膿腫牙齒發生在上顎的第四小白齒或第一大白齒，外面的徵象很多時候會誤以為是源自其他問題，例如眼部感染或被刺傷。這是由於牙根位於眼睛的正下方，因此當它們開始有膿腫時，會很快地擴散至周邊組織。在膿腫快要爆破之前，眼部下面的組織通常會腫脹和發炎。

## 如何診斷寵物有膿腫牙齒？

當牙齒明顯地片塊斷裂或受損，並伴隨著有液體流出時，要診斷這些病例既簡單又直接。要判斷膿腫牙齒是否擴散至周邊的牙齒，以及有沒有影響寵物的健康，獸醫將需要為牠進行牙科 X 光檢查。

## 有什麼方法可治療膿腫牙齒？

膿腫牙齒可以造成極大的痛楚，而且需要盡快接受治療。給用抗生素可控制寵物的受感染程度，至於要舒緩痛楚，可給用消炎及/或鎮痛藥物。雖然藥物治療有助應付症狀，然而不能治療牙齒受損的潛在原因。

治療膿腫牙齒有兩種方法。中種是通常可以保存牙齒的牙槽治療，另一種選擇是拔除牙齒。

假如進行牙槽治療，那麼有機會能將牙齒保存。不過就膿腫牙齒採用牙槽治療能否成功，將取決於周邊組織的健康及受影響牙齒的情況。

假如膿腫牙齒周圍的牙槽失去大量骨骼，或牙冠明顯地受損，獸醫可能會建議最好的療法是拔除牙齒。要視乎膿腫的嚴重程度以及牙齒與周邊結構的受損情況，獸醫可為你的狗隻提供最適合的選項。

所有寵物都應該至少每六個月接受一次由獸醫進行的牙科檢查。



這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：Jan Bellows 獸醫學博士、美國獸醫牙科學院文憑、美國獸醫學會註冊

© 版權聲明 2013 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。