勝利動物醫院
Victory Animal Hospital

勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332
電郵：info@globavet.com

狗隻患前庭疾病

什麼是前庭疾病？

前庭系統負責維持身體正常的平衡力。中樞前庭系統位於大腦，而周邊前庭系統則位於內耳和中耳裡面。

前庭疾病是指突然發生且非漸進式地失去平衡，這較常見於年紀較大的狗隻。這病也被稱為老狗前庭症候群或犬隻突發性前庭症候群。

前庭疾病有什麼臨床徵象？

大多數狗隻在開始病發時，會失去平衡、迷失方向、頭部傾側，以及出現眼球震顫，即眼球突然抽動。許多狗隻會變得不願意站立或行走。大多數狗隻會向頭部傾側的那邊傾斜或跌倒。



Used Under License
Copyright© Lifelearn Inc.

前庭疾病的成因是什麼？

前庭疾病的成因包括中耳或內耳受感染、對耳朵有毒的藥物、創傷或受傷、腫瘤及甲狀腺功能減退症。假如不能診斷寵物患有特定的疾病，這種病情可稱為犬隻突發性前庭症候群。這些病例的分別在於臨床徵象會突然出現，然後不論採取少許甚至沒有使用藥物治療，情況都會急劇改善。

如何診斷狗隻患前庭疾病？

診斷此病要根據狗隻的病歷、臨床徵象以及血液和尿液測試的結果。在一些個案中，診斷性測試會包括進行頭部的放射攝影，以評估中耳、內耳及鼓泡的外貌。若要觀察是否有腫瘤或其他異常，間中需要進行磁力共振成像（MRI）或電腦斷層掃描（CT）。也可以為某些患病寵物進行腦幹聽覺誘發電位（BAER）。

要確診犬隻突發性前庭症候群，要符合以下條件：

1. 是年紀較大的狗。
2. 突然出現周邊前庭徵象。
3. 不能檢驗出成因：外耳或中耳沒有受感染，也沒有出現其他疾病的徵象，如耳毒性、創傷、甲狀腺功能減退症及立克次體病等。
4. 徵象在幾星期後消失。

如何治療前庭疾病？

如果能分辨潛在成因，治療方向應朝著這成因。在嚴重的個案中，可能需要向寵物提供輔助療法，如靜脈輸液和住院護理，直至牠可以自行進食和行走。假如寵物有迷失方向或共濟失調（失足、難以站立或行走）的情況，可能需要注射鎮定劑來幫助牠放鬆。

這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：R Ernest Ward 獸醫學博士
© 版權聲明 2009 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。